

OSTEOSPERMUM ECKLONIS

Erhältlich auch als: cool & easy und quick & easy (Kulturbeschreibung siehe Seite 21+22)

Normalkultur

TOPFTERMIN UND m²-BELEGUNG

Topfgröße 12 cm: Woche 2–8 25–30 Stk./m²

SUBSTRAT

Verwenden Sie ein Substrat mit sehr hoher Strukturstabilität, pH ~6,0

DÜNGUNG

Beginn spätestens 2 Wochen nach dem Topfen

- Bewässerungsdüngung 0,1–0,12%
- Intervalldüngung 0,2–0,3% 1–2x/Woche
- Düngung mit Volldünger z.B. 18-10-18-2

Die Hotline empfiehlt: Salzwerte sollten EC 2,0 nicht übersteigen

TEMPERATUR

1.–3. Kulturwoche: Heizung (Tagesmitteltemperatur) 18 °C Tag und Nacht, Lüftung 20–22 °C

ab 4. Kulturwoche: Heizung (Tagesmitteltemperatur) 14 °C Tag und Nacht, Lüftung 16–18 °C

COOL MORNING

Einsatzbeginn nach der Anwachsphase; Temperaturabsenkung ab 4.00 Uhr auf 8 °C bei einer Einsatzdauer von 6 Std. fördert kompakten Wuchs, bessere Stielqualität, frühere Blüte. Durch Cool Morning können weitere Hemmstoffbehandlungen entfallen

BEWÄSSERUNG

Gleichmäßig feucht halten

LICHT

Hoher Lichtbedarf; für frühe Sätze: Tageslänge auf 16 Stunden verlängern, durch Einsatz von Assimilationslicht (3000 lx)

STUTZEN

7 Tage nach dem Topfen

WACHSTUMSREGULIERUNG

Aufgrund der aktuellen Zulassungssituation bei Wachstumsregulatoren bitten wir Sie, sich mit ihrem Selecta Außendienstmitarbeiter in Verbindung zu setzen.

PFLANZENSCHUTZ

Thrips, Weiße Fliege, Blattläuse, Minierfliege, falscher Mehltau, Alternaria

Kalkkultur

TOPFTERMIN

Topfgröße 12 cm: Woche 40–50 25–30 Stk./m²

SUBSTRAT

Substrat mit sehr hoher Strukturstabilität verwenden, pH ~6,0

DÜNGUNG

Beginn spätestens 2 Wochen nach dem Topfen

- Bewässerungsdüngung 0,1–0,12%

- Intervalldüngung 0,2–0,3% 1–2x/Woche
- Düngung mit Volldünger, z.B. 18-10-18-2

Die Hotline empfiehlt: Salzwerte sollten EC 2,0 nicht übersteigen

TEMPERATUR

- 1.–4. Kulturwoche: Heizung (Tagesmitteltemperatur): 18–20 °C/Lüftung: 20–22 °C
- bei einer Austriebslänge von mind. 3 cm stufenweise Absenken auf: 4–6 °C Lüftung: gleiche Absenkung, jedoch immer 2 °C höher als Heizung
- Kühlphase mind. 4 Wo. (besser 6 Wo) bis spätestens 9 Wo. vor gewünschtem Verkaufsbeginn
- Wachstums-/Blühphase: Heizung (Tagesmitteltemperatur): stufenweise Anhebung auf 12–14 °C Lüftung: 16–18 °C

COOL MORNING

Mit Beginn der Wachstums-/Blühphase (nach Kühlphase) Temperaturabsenkung ab 4.00 Uhr auf 8 °C für 6 Std; durch Cool Morning können weitere Hemmstoffbehandlungen entfallen

BEWÄSSERUNG

Gleichmäßig feucht halten; in der Kühlphase relativ trocken kultivieren

LICHT

Hoher Lichtbedarf; für frühe Sätze: Tageslänge auf 16 Stunden verlängern durch Einsatz von Assimilationslicht (3000 lx)

STUTZEN

7 Tage nach dem Topfen

WACHSTUMSREGULIERUNG

Aufgrund der aktuellen Zulassungssituation bei Wachstumsregulatoren bitten wir Sie, sich mit Ihrem Selecta Außendienstmitarbeiter in Verbindung zu setzen.

PFLANZENSCHUTZ

Thrips, Weiße Fliege, Blattläuse, Minierfliege, Falscher Mehltau, Alternaria

KULTURSCHEMA KALKULTUR OSTEOSPERMUM ECKLONIS

	Topfen	Stutzen	Kultur			Blüte
Woche	43	45	47–48	49–5	5–14	14
Temperatur	18 °C	18 °C	14 °C	4–6 °C	12–14 °C	